

# Виагра софт – инструкция по применению

## 1. Общие сведения

- Для чего нужна Виагра софт

Виагра софт предназначается для получения результата увеличения притока крови к определенным областям мужского полового органа. Виагра софт, как и другие ингибиторы ФДЭ-5, работает за счет эффекта влияния на химические элементы организма, которые выделяются во время сексуального возбуждения, что дает возможность увеличивать приток крови в мужской половой член и обеспечивает стойкую эрекцию.

- Фармакотерапевтическая группа

Препарат относится к группе лекарств предназначенных для лечения эректильной дисфункции у мужчин различного возраста (старше 18 лет).

## 2. Форма выпуска, упаковка, состав

- Вид таблеток

Белые ромбовидные таблетки.

- Упаковка

Таблетки упакованы по 10 таблеток в блистере. Блистеры упаковываются в картонную коробку.

- Состав таблетки

*Активное вещество:* силденафила цитрат 100 мг.

*Дополнительные вещества:* безводный кальция гидрофосфат, целлюлоза, магния стеарат, натрия кроскармеллоза, титана двуокись, гипромеллоза, лактоза, триацетин.

### 3. Дозировка

Рекомендуемая доза составляет 50 мг примерно за 30-60 минут до предполагаемой половой активности. Исходя из эффективности и индивидуальной переносимости эта доза может быть либо снижена до 25 мг, либо увеличена до 100 мг. Максимальная рекомендуемая доза в сутки составляет 100 мг в количестве - 1 раз. Такая же доза назначается пожилым людям и пациентам с нарушением функций печени или почек.

#### Корректировка дозы:

- Для здоровых пожилых людей (65 лет и старше) корректировка не требуется.
- Для людей, у которых присутствуют заболевания легкой (КК 50-80 мл/мин) или средней (КК 30-49 мл/мин) почечной недостаточностью, корректировка дозировки не требуется.
- У людей с тяжелой формой почечной недостаточностью (30 мл/мин) увеличивался AUC (100 %) и Стах (88 %) по сравнению со здоровыми людьми такого же возраста.
- У людей с циррозом печени клиренс силденафила снижается, из-за чего показатели AUC (84 %) и Стах (47 %) увеличиваются.

#### Совместимость препарата:

- Виagra софт + циметидин (800 мг) = повышение концентрации силденафила в плазме на 56 %.
- Виagra софт + ингибиторы CYP3A4 (эритромицин, кетоконазол, циметидин) = снижение клиренса силденафила. Частота побочных эффектов не увеличивается.
- Виagra софт + однократный прием антацида (алюминия гидроксида/магния гидроксида) = отсутствие влияния на биодоступность Виagры софт.
- Виagra софт + ингибиторы CYP2C9 (варфарин, толбутамин) = влияние не обнаружено.
- Виagra софт + ингибиторы CYP2D6 (трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) = влияние не обнаружено.
- Виagra софт + тиазидоподобные диуретики и тиазиды, калийсберегающие и петлевые диуретики = влияние не обнаружено.

- Виагра софт + ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, индукторы метаболизма СYP450 (барбитураты, рифампицин) = влияние не обнаружено.
- Виагра софт (50 мг) + аспирин (150 мг) = дополнительное кровотечение не возникало.
- Виагра софт + алкоголь (в среднем 80 мг/дл) = никакого влияния не обнаружено.
- Виагра софт + нитраты или донаторы окиси азота = противопоказано совместный прием (усиливается гипотензивное действие нитратов в острой пробе)

## 4. Передозировка

При однократном приеме препарата до 800 мг у здоровых людей нежелательных явления были такими же, как и при приеме Виагры софт в меньших дозах, однако частота возрастала. В случае передозировки нужно принять стандартные меры лечения симптомов. Диализ не ускорит клиренс силденафила, поскольку не выводится с мочой.

## 5. Побочные эффекты

При приеме дженерика Виагры могут возникнуть следующие побочные эффекты:

- Приливы к лицу – 10,9%;
- Головная боль – 10,8 %;
- Нарушение обоняния – 5,5 %;
- Головокружения – 2,9 %;
- Нарушение в работе желудка – 3 %;
- Заложенность носа – 2,1 %;
- Сердцебиение – 1 %;
- Менее 1 % - нарушение восприятия цветового зрения (мир виден преимущественно в голубом цвете, может возникнуть повышенная чувствительность к яркому свету).

## 6. Противопоказания

- Виagra софт **противопоказана** тем пациентам, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту таблетки.
- Препарат **противопоказан** пациентам с тяжелой степенью почечной недостаточностью, недавно перенесенные инфаркт миокарда или инсульт, гипотензия (артериальное давление менее 90/80 мм рт. ст.), при наследственных дегенеративных заболеваниях сетчатки (пигментация сетчатки, к примеру).
- Виaгpу софт необходимо применять **с осторожностью** людям больных анатомической деформацией члена (болезнь Пейрони, ангуляция, кавернозный фиброз), людям, которые предрасположены к приапизму (лейкемия, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия).
- **Не следует** употреблять Виaгpу софт лицам, которым нежелательна сексуальная активность.
- **С осторожностью** необходимо принимать Виaгpу софт тем людям, у которых есть болезни с сопутствующей кровоточивостью, а также с обостренной язвенной болезнью.
- Пациентам с наследственным пигментным ретинитом препарат необходимо применять **с осторожностью**.
- При управлении механизмами и автомобилем никакие меры предосторожности не нужны.

## 7. Показания

Виaгpу софт предназначена для мужчин разных возрастов, но старше 18 лет, которые испытывают сложности с эрекцией. Жевательная Виaгpу софт является отличным способом избавиться от эректильной дисфункции и половыми расстройствами при психологических, органических проблемах, а также при смешанном происхождении.

## **8. Сроки и условия хранения**

Срок хранения – 2 года с даты, указанной на блистере, при температуре до 30 Цельсия, в недоступном для детей и домашних животных месте.